

Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

(Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut / STIKO)

Stand: Juli 2001

Impfungen gegen	Alter in vollendeten Monaten						Alter in vollendeten Jahren	
	Geburt	2.	3.	4.	11. – 14.	15. – 23. (siehe ⁶⁾)	4. bis 5. (siehe ⁶⁾)	9. bis 17. (siehe ⁶⁾)
Diphtherie-Tetanus-Pertussis		1.	2.	3.	4.		Auffrischimpfung Tetanus, Diphtherie	Auffrischimpfung ⁵⁾
Polio (IPV)		1.	¹⁾	2.	3.			Auffrischimpfung
Haemophilus influenzae Typ B		1.	¹⁾	2.	3.			
Hepatitis B	²⁾	1.	¹⁾	2.	3.			Grund- immunisierung ³⁾
Masern-Mumps-Röteln ⁴⁾					1.	2.		Grund- immunisierung ³⁾

* Nach Impfeempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand: Juli 2001
Quelle: Epidemiologisches Bulletin 28/01, Robert Koch-Institut

- 1) Bei Verwendung von Kombinationsimpfstoffen, die eine Pertussiskomponente enthalten.
- 2) Die Hepatitis-B-Impfung ist (bei Indikation) gleich nach der Geburt des Kindes möglich.
- 3) Grundimmunisierung für alle Kinder und Jugendliche, die bisher nicht geimpft wurden, bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes.
- 4) Die 2. MMR-Impfung kann bereits vier Wochen nach der 1. MMR-Impfung erfolgen.
- 5) Eine fehlende Grundimmunisierung gegen Keuchhusten (Pertussis) kann nachgeholt werden.
- 6) Zu diesen Zeitpunkten soll der Impfstatus überprüft und gegebenenfalls vervollständigt werden.

- Für alle 12 – 15 jährigen Jugendlichen, die noch keine Windpocken (Varizellen) durchgemacht haben, empfiehlt die STIKO eine Windpockenimpfung. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist zur Zeit noch nicht geklärt.

Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

(Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut / STIKO)

Stand: Juli 2001

Empfohlenes Impfalter	Impfung gegen
Ab vollendetem 2. Monat (ab Beginn 9. Lebenswoche)	1. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV)-Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB) oder Einzelimpfung
Ab vollendetem 3. Monat (ab Beginn 13. Lebenswoche)	2. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV)-Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB) oder Einzelimpfung (Bei Impfstoffkombinationen, die <u>keine</u> Pertussis-komponente enthalten, entfällt diese Impfung.)
Ab vollendetem 4. Monat (ab Beginn 17. Lebenswoche)	3. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV)-Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB) oder Einzelimpfung
Ab vollendetem 11. - 14. Monat	4. Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio (IPV)-Haemophilus influenzae Typ b - Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB) oder Einzelimpfung 1. Masern-Mumps-Röteln (MMR)
Ab vollendetem 15. - 23. Monat	2. Masern-Mumps-Röteln (MMR)
Ab vollendetem 4. - 5. Lebensjahr	Tetanus-Diphtherie (Td-Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt)
Ab vollendetem 9. - 17. Lebensjahr	Polio (IPV) → zur Auffrischung Tetanus-Diphtherie (Td) → zur Auffrischung Pertussis (aP) → zur Auffrischung Masern-Mumps-Röteln (MMR) → für alle Kinder u. Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden oder mit unvollständigem Impfschutz. Hepatitis B → für alle Kinder u. Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden oder mit unvollständigem Impfschutz.

- Für alle 12 – 15 jährigen Jugendlichen, die noch keine Windpocken (Varizellen) durchgemacht haben, empfiehlt die STIKO eine Windpockenimpfung. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ist zur Zeit noch nicht geklärt.